

Suomen virallinen tilasto
Finlands officiella statistik
Official Statistics of Finland

27.3.2006

Terveys 2006
Hälsa
Health

Raskaudenkeskeytykset – vuoden 2005 ennakkotiedot

Aborter - preliminära uppgifter för 2005

Induced abortions - preliminary data 2005

Hanna Eronen
+358 9 3967 2346

Anne Soimula
+358 9 3967 2359

Mika Gissler
+358 9 3967 2279


sähköposti:
etunimi.sukunimi@stakes.fi

Telefax
+358 9 3967 2324

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2005 tehtiin 10 785 raskaudenkeskeytystä eli 9,2 keskeytystä tuhatta hedelmällisyysikäistä naista kohden. Tämä on noin 300 keskeytystä (2,8 %) vähemmän kuin vuonna 2004.

Keskeytysten määrä nousi hieman 25-29- ja 40-44 -vuotiailla, mutta väheni muissa ikäryhmissä. Alle 20-vuotiaiden keskeytykset vähenivät 5,8 % verrattuna vuoteen 2004. Eniten keskeytyksiä tehdään edelleen 20-24 -vuotiaille, mutta tässäkin ikäryhmässä keskeytykset vähenivät 2,2 %. Sairaanhoitopiireittäin tarkasteltuna eniten keskeytyksiä tehtiin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä (12,1/1000) ja vähiten Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (6,7/1000).

Kuvio 1: Keskeytykset ikäryhmittäin tuhatta vastaavanikäistä naista kohti vuosina 2004-2005*



* ennakkotieto

Sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja
kehittämiskeskus
Forsknings- och utvecklings-
centralen för social- och
hälsovården
National Research and
Development Centre for
Welfare and Health
Puhelin (09) 39 671
Telefon +358 9 396 71
Phone +358 9 396 71
Telefaksi (09) 3967 2459
Telefax +358 9 3967 2459
www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)
ISSN 1459-2347
(painettu - printed)

Noin 63 prosenttia raskaudenkeskeytyspotilaista ilmoitti käyttäneensä jonkinlaista ehkäisymenetelmää raskauden alkaessa. Alle 20-vuotiaista 40 % ei ollut käyttänyt mitään ehkäisyä tai ehkäisymenetelmää ei ollut tietoa. 48 % alle 20-vuotiaista keskeytyspotilaista ilmoitti käyttäneensä ehkäisynä kondomia ja jälkiehkäisyä oli käyttänyt vain 1,9 %. Jälkiehkäisyä oli käyttänyt 2,7 % kaikista keskeytyspotilaista eli hieman enemmän kuin vuonna 2004.

Yleisin suunniteltu ehkäisymenetelmä keskeytyksen jälkeen oli e-pilleri (54 %). Alle 20 -vuotiaille e-pilleriä suunniteltiin ehkäisykeinoksi noin 80 prosentissa tapauksista. Suunniteltua ehkäisyä ei ollut tai siitä ei ollut tietoa noin 3 prosentilla keskeytyspotilaista. Alle 20-vuotiaista 5 % ei ollut suunniteltua ehkäisyä tai siitä ei ollut tietoa.

Noin 93 % raskaudenkeskeytyksistä suoritettiin ennen 12. raskausviikkoa. Ennen 7. raskausviikkoa tehtyjen keskeytysten osuus on kasvanut vuosittain olleen 59,7 prosenttia vuonna 2005. Vuonna 2005 vajaalla puolella keskeytyspotilaista oli vähintään yksi aikaisempi synnytys. Vähintään yksi aiempi keskeytys oli lähes 32 prosentilla keskeyttäneistä ja vähintään kaksi aiempaa keskeytystä noin 10 prosentilla. Keskeytyspotilaista 20 prosenttia oli naimisissa ja naimattomia oli 72 prosenttia. Eronneita ja leskiä oli 8 prosenttia.

Sosiaaliset syyt keskeytyksen perusteena lisääntyivät edelleen (89,9, %) vuonna 2005. Muita yleisiä syitä olivat alle 17 vuoden ikä (6,3 %), yli 40 vuoden ikä (4,0 %) ja neljän lapsen synnyttäminen (2,2 %). 0,5 % keskeytyksistä tehtiin lääketieteellisellä perusteella eli sairaudesta, ruumiinviaista tai heikkoudesta naisen hengelle tai terveydelle aiheutuvan vaaran vuoksi. Mahdollisen tai todetun sikiövaurion vuoksi tehtiin hieman enemmän keskeytyksiä kuin vuonna 2004 (2,6 % kaikista keskeytyksistä). Keskeytyksen perusteena on vuodesta 2001 alkaen voinut käyttää enemmän kuin yhtä syytä.

Taulukot:

Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2005*

Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2005*

Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970-2005*

Taulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2005*

Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985-2005*

Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987-2005*

Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987-2005*

Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy 1980, 1985, 1989-2005*, %

Taulukko 9: Raskaudenkeskeytyspotilaille suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen 1983-2005*, %

Taulukko 10: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 1999-2005*

*) Ennakkotieto.

Lähteet

Ensimmäinen laki raskauden keskeyttämisestä tuli voimaan heinäkuun 1. päivänä 1950. Tilastoja keskeytyksistä on julkaistu vuodesta 1951 lähtien. Nykyinen raskauden keskeyttämisiä koskeva laki on peräisin vuodelta 1970.

Keskeytyksiä koskevan lain (Laki raskauden keskeyttämisestä 239/1970) sekä sen nojalla annetun asetuksen (Asetus raskauden keskeyttämisestä 359/1970; Steriloimisasetus 427/1985) mukaisesti suorittajalääkäriin on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla lomakkeella ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukseen (Stakes) suoritetusta toimenpiteestä kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta.

Tiedot tallennetaan raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimisrekisteriin, jota Stakes ylläpitää terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereitä koskevan lain (556/1989) ja sen nojalla annetun asetuksen (774/1989) 6 §:n perusteella.

Varhaisempien vuosien tilastot on saatu osana virallista tilastoa ilmestyneistä lääkintöhallituksen julkaisuista (Lääkintölaitos vuosina 1935-1954; Yleinen terveyden- ja sairaanhoito vuosina 1955-1970; Terveydenhuolto vuosina 1971-1987). Vuodesta 1987 lähtien rekisterin tiedot ovat olleet Stakesin tietokannassa. Vuoden 2004 tiedot ovat ennakkotietoja ja perustuvat tilanteeseen 24.3.2005. Lopulliset, tarkastetut tiedot julkaistaan syksyllä 2006.

Ikäryhmittäisessä tarkastelussa on huomattava, että rekisterin ikätieto on vuodesta 1994 lähtien potilaan ikä toimenpidepäivänä, mutta ennen tätä ikä vuoden lopussa. Tähän julkaisuun on takautuvasti laskettu vuosien 1986-1993 tiedot käyttämällä potilaan ikää toimenpidepäivänä.

Käsitteet ja määritelmät

Raskauden keskeytys: Ihmisen toimenpitein käynnistetty raskauden päättymisen, joka ei täytä synnytyksen määritelmää ja jossa sikiön ei tiedetä kuolleen kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä.

Steriloimisella tarkoitetaan miehen tai naisen sukuelimiin kohdistuvaa toimenpidettä, joka johtaa pysyvään suvunjakamiskyvyttömyyteen. Steriloinneiksi ei katsota sellaisia sukuelimiä koskevia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen ruumiillisen sairauden hoitamiseksi.

Aborter 2005 - preliminära uppgifter

År 2005 gjordes enligt preliminära uppgifter 10 785 aborter, dvs. 9,2 aborter per 1 000 fertila kvinnor. Detta är cirka 300 aborter (2,8 %) färre än 2004.

Hanna Eronen
+358 9 3967 2346

Anne Soimula
+358 9 3967 2359


Mika Gissler
+358 9 3967 2279

e-post:
förnamn.efternamn@stakes.fi

Telefax
+358 9 3967 2324

Antalet aborter ökade lite i åldrarna 25–29 år och 40–44 år, men det minskade i de övriga åldersgrupperna. Aborterna bland kvinnor under 20 år ökade med 1,5 procent jämfört med föregående år. Mest aborter görs fortfarande i åldrarna 20–24 år, men även i denna åldersgrupp minskade antalet med 2,2 procent. En granskning enligt sjukvårdsdistrikt visar att mest aborter utfördes i Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt (12,1/1 000) och minst i Sydösterbottens sjukvårdsdistrikt (6,7/1 000).

Diagram 1: Antal aborter efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor i samma åldrar 2004–2005*



* Preliminära uppgifter

Cirka 63 procent av abortpatienterna uppgav att de använt någon typ av preventivmedel när graviditeten uppstod. I åldrarna under 20 år var 40 procent av fallen sådana där inget preventivmedel använts eller där det inte fanns några uppgifter om preventivmetoden. Av abortpatienterna under 20 år uppgav 48 procent att de använt kondom som preventivmedel. Endast 1,9 procent hade använt akut p-piller. Av alla abortpatienter hade 2,7 procent använt akut p-piller, dvs. lite fler än 2004.

Den vanligaste planerade preventivmetoden efter ett abortingrepp var p-piller (54 %). För kvinnor under 20 år planerades p-piller som preventivmetod i cirka 80 procent av fallen. Ungefär 3 procent av abortpatienterna hade registrerats som fall där inget preventivmedel använts eller där det inte fanns några uppgifter om använd preventivmetod. I åldrarna under 20 år var motsvarande procenttal 5 procent.

Ungefär 93 procent av aborterna gjordes före den 12:e graviditetsveckan. Andelen aborter som utförts före den 7:e graviditetsveckan har ökat varje år. År 2005 var den 59,7 procent. År 2005 hade knappt hälften av abortpatienterna fött minst ett barn. Nästan 32 procent av dem som genomgick abort hade genomgått minst en tidigare abort. Cirka 10 procent hade genomgått minst två tidigare aborter. Av abortpatienterna var 20 procent gifta och 72 procent ogifta. Andelen fränskilda och änkor var 8 procent.

Antalet aborter på sociala indikationer ökade fortfarande (89,9 %) år 2005. Andra vanliga indikationer var ålder under 17 år (6,3 %) eller över 40 år (4,0 %) och fyra tidigare förlossningar (2,2 %). Av aborterna utfördes 0,5 procent på medicinsk indikation, dvs. till följd av sjukdom, kroppsslyte eller svaghet som kan medföra fara för kvinnans liv eller hälsa. År 2005 utfördes lite mer aborter på grund av möjlig eller konstaterad fosterskada än 2004 (2,6 % av alla aborter). Från och med 2001 har flera än en abortindikation kunnat åberopas.

Tabeller:

Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969–1970, 1975–2005*

Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2005*

Tabell 3: Indikationer för abort 1970–2005*

Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2005*

Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985–2005*

Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987–2005*

Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987–2005*

Tabell 8: Preventivmedel som abortpatienterna har använt 1980, 1985, 1989–2005*, %

Tabell 9: Planerad preventivmetod för abortpatienter efter abort 1983–2005*, %

Tabell 10: Abortmetoder 1999–2005*

*) Preliminära uppgifter.

Källa

Den första lagen om avbrytande av havandeskap trädde i kraft den 1 juli 1950 och statistik över aborter har publicerats sedan 1951. Den gällande lagen om avbrytande av havandeskap är från år 1970.

Enligt lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970) och den förordning som utfärdats med stöd av den (Förordning om avbrytande av havandeskap 359/1970, Steriliseringsförordning 427/1985) skall den läkare som har utfört ingreppet skicka en anmälan om åtgärden inom en månad på en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd blankett till Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes).

Uppgifterna lagras i registret över aborter och steriliseringar som Stakes upprätthåller i enlighet med lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) och 6 § i den förordning (774/1989) som utfärdats med stöd av denna lag.

Statistik från tidigare år kommer från Medicinalstyrelsens publikationer, som har utgivits som en del av den officiella statistiken (Lääkintölaivos [Medicinalverket] 1935–1954), Yleinen terveyden- ja sairaanhoito [Allmän hälso- och sjukvård] 1955–1970), Terveysthuolto [Hälso- och sjukvård] 1971–1987. Från 1987 har registeruppgifterna funnits i Stakes databas. Uppgifterna för 2004 är preliminära och grundar sig på situationen den 24 mars 2005. De slutgiltiga, granskade uppgifterna offentliggörs under hösten 2006.

När man granskar uppgifter efter åldersgrupp, är det viktigt att beakta att åldersuppgifterna från och med 1994 baserar sig på patientens ålder på ingreppsdagen och före 1994 vid årets slut. I denna publikation har uppgifterna för åren 1986–1993 beräknats retroaktivt genom att använda patientens ålder på ingreppsdagen

Begrepp och definitioner

Abort (avbrytande av graviditet): En graviditet som avbrutits medvetet och som inte överensstämmer med definitionen på en förlossning och där man vet att fostret inte dött intrauterint före själva ingreppet.

Med **sterilisering** avses ett ingrepp i en mans eller en kvinnas könsorgan, som medför bestående avsaknad av fortplantningsförmåga. Sådana ingrepp i könsorganen som är nödvändiga i behandlingen av somatiska sjukdomar betraktas inte som steriliseringar.

Suomen virallinen tilasto
Finlands officiella statistik
Official Statistics of Finland

27.3.2006

Terveystutkimus 2006
Hälsa
Health

Induced abortions 2005 - preliminary data

Hanna Eronen
+358 9 3967 2346

Anne Soimula
+358 9 3967 2359

Mika Gissler
+358 9 3967 2279


e-mail:
firstname.surname@stakes.fi

Telefax
+358 9 3967 2324

According to preliminary data, 10 785 induced abortions were performed in Finland in 2005, representing 9.2 abortions per thousand women of fertile age. This is some 300 abortions (2.8 per cent) less than in 2004.

The number of induced abortions increased slightly among women aged 25–29 and 40–44 but declined in the other age groups. In the under-20 age group, abortions decreased 5.8 per cent compared with 2004. While the number of abortions was still highest in the 20–24 age group, even this group showed a decrease of 2.2 per cent. The number of abortions by hospital district was highest in the hospital district of Länsi-Pohja (12.1 per 1000) and lowest in the hospital district of South Ostrobothnia (6.7 per 1000).

Figure 1: Induced abortions by age per thousand women of the same age 2004–2005*



* Preliminary data.

Some 63 per cent of the abortion patients reported having used some contraceptive method when the pregnancy started. In the under-20 age group, 40 per cent of the abortion patients had used no contraceptive method or there was no knowledge of the method. In the same age group, 48 per cent reported having used a condom and a mere 1.9 per cent post-coital oral contraceptive. Of all abortion patients, 2.7 per cent had used post-coital oral contraceptive, which is slightly more than in 2004.

The most common planned contraceptive method after abortion was the pill (54 per cent). The pill was the planned contraceptive method for abortion patients under 20 in 80 per cent of the cases. Approximately 3 per cent of the abortion patients under 20 had no planned contraceptive method or there was no knowledge of the method. In the under-20 age group, 5 per cent had no planned contraceptive method or there was no knowledge of the method.

Some 93 per cent of the abortions were performed before the 12th week of gestation. The proportion of induced abortions performed before the 7th week of gestation has increased annually, being 59.7 per cent in 2005. In 2005, less than half of the abortion patients had at least one previous delivery. At least one earlier induced abortion had been performed on almost 32 per cent of the abortion patients and at least two earlier abortions on about 10 per cent of the patients. The proportion of married abortion patients was 20 per cent, compared with 72 per cent for unmarried patients. The proportion of divorced women and widows was 8 per cent.

The proportion of abortions performed on social grounds was still increasing (89.9 per cent) in 2005. The other common reasons for abortion were the patient being under 17 (6.3 per cent) or over 40 (4.0 per cent), or having given birth to four children (2.2 per cent). 0.5 per cent of induced abortions were performed on medical grounds, meaning that the pregnancy would have endangered the woman's life or health because of illness, a physical disability or debility. The number of abortions performed because of a potential or detected foetal defect was slightly higher than in 2004 (2.6 per cent of all induced abortions). Since 2001, more than one ground for the abortion has been possible.

Tables:

Table 1: Induced abortions by age, 1969–1970, 1975-2005*

Table 2: Induced abortions by hospital district and age, 2005*

Table 3: Indications for induced abortions, 1970-2005*

Table 4: Induced abortions by indication, 2005*

Table 5: Induced abortions by gestation length, 1985-2005*

Table 6: Induced abortions by previous deliveries, 1987-2005*

Table 7: Induced abortions by previous abortions, 1987-2005*

Table 8: Contraceptives used by abortion patients, 1980, 1985, 1989-2005*, %

Table 9: Planned contraceptive method for abortion patients after the abortion 1983-2005*, %

Table 10: Methods for induced abortion, 1999-2005*

*) Preliminary data.

Sources

In Finland, the Act on Induced Abortion, the first ever piece of legislation on abortion, came into force on 1 July 1950, and statistics on induced abortions have been published since 1951. The current Act on Induced Abortion is from 1970.

According to current legislation (Act on Induced Abortion 239/1970, Decree on Induced Abortion 359/1970, Decree on Sterilisation 427/1985), the physician performing the procedure is required to report the case to the National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) within one month using a specific data collection form approved by the Ministry of Social Affairs and Health.

The data are stored on the Register on Induced Abortions and Sterilisations, a statutory register maintained by STAKES in accordance with the Act on National Personal Records Kept under the Health Care System (556/1989) and Section 6 of the relevant Decree (774/1989).

Official statistical publications by the National Board of Health (one of STAKES' predecessors) have been used as a source of information for earlier years. Since 1987, the register has been on the STAKES database. The data for 2004 are preliminary and based on the situation on 24 March 2005. The final data will be published in autumn 2006.

With regard to the data by age group, it should be noted that from 1994 onwards age data in the register refer to the age of the patient on the day of the procedure, whereas the data for preceding years refers to the age at the end of the year. For this publication, the data for 1986–1993 have been calculated retrospectively using the patient's age on the day of the procedure.

Terms and definitions

Induced abortion: Artificially induced termination of pregnancy which does not comply with the definition of a birth and in which there is no indication of intrauterine foetal death before the termination.

Sterilisation refers to an operation on the male or female genitals resulting in permanent inability to produce offspring. Operations performed on the genitals in cases where the operation is regarded as necessary in the treatment of a somatic disease are not regarded as sterilisations.

Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2005*

Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969-1970, 1975-2005*

Table 1: Induced abortions by age, 1969-1970, 1975-2005*

Vuosi År Year	Keskey- tyksiä Aborter Abortions	Per 1000 elävänä syntynyttä levande födda live births	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti ⁽¹⁾ Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor i samma åldrar By age group per 1 000 women of the same age							
			15-19 ⁽²⁾	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	15-49
1969	8 175	121,2	3,6	8,1	10,2	10,8	9,9	6,9	1,0	7,0
1970	14 757	225,8	8,3	15,4	17,8	18,0	16,6	11,8	1,6	12,7
1975	21 547	327,9	21,2	26,0	22,0	17,6	17,1	13,2	1,7	17,9
1976	19 818	296,5	20,4	24,7	17,5	16,0	15,8	11,8	2,3	16,4
1977	17 772	270,7	19,5	22,0	16,1	14,6	13,4	10,3	1,8	14,7
1978	16 928	264,5	19,8	21,4	15,4	13,0	11,7	9,9	1,6	14,0
1979	15 849	249,9	19,5	20,2	13,6	12,1	10,4	9,1	1,7	13,0
1980	15 037	238,4	19,4	19,7	12,2	11,0	10,3	8,2	1,7	12,3
1981	14 120	222,5	17,9	18,3	11,5	10,2	9,9	7,9	1,4	11,5
1982	13 861	209,7	17,9	18,7	11,0	9,8	9,5	6,9	1,3	11,2
1983	13 360	119,7	17,1	18,4	10,9	9,2	9,1	6,2	1,4	10,7
1984	13 645	209,7	16,9	18,7	11,1	9,8	9,4	6,5	1,3	10,9
1985	13 787	220,3	16,5	19,5	11,8	9,9	9,3	6,6	1,3	11,0
1986	13 316	219,7	17,8	18,7	11,2	10,0	8,8	5,2	0,8	10,6
1987	12 986	217,4	17,9	18,3	11,7	9,3	8,2	5,5	0,8	10,3
1988	12 738	201,6	17,0	19,5	12,0	9,0	8,0	4,9	0,7	10,2
1989	12 646	199,7	17,2	18,5	12,8	9,4	7,8	4,9	0,7	10,1
1990	12 217	186,6	15,9	18,3	12,6	9,7	7,6	4,6	0,9	9,7
1991	11 737	179,7	13,9	17,6	13,1	9,7	7,7	4,2	0,7	9,3
1992	11 069	166,0	12,9	16,5	12,7	9,8	7,2	3,7	0,6	8,7
1993	10 375	160,2	11,2	15,6	12,6	9,6	7,0	3,2	0,5	8,1
1994	10 012	154,3	10,7	14,5	13,0	10,0	6,3	3,2	0,5	7,9
1995	9 872	157,1	11,0	14,5	12,9	9,6	6,6	3,0	0,4	7,8
1996	10 423	172,3	11,4	15,1	13,8	11,0	7,1	2,9	0,4	8,3
1997	10 250	173,6	12,0	14,6	13,3	10,9	7,1	2,9	0,3	8,2
1998	10 751	189,3	13,0	15,1	13,6	11,7	7,7	3,0	0,2	8,7
1999	10 837	188,6	14,1	15,7	13,7	10,9	7,7	2,9	0,3	8,8
2000	10 931	193,3	14,8	16,0	13,0	11,2	7,9	3,0	0,2	9,0
2001	10 739	192,5	15,4	15,0	13,1	10,7	7,5	3,2	0,2	8,8
2002	10 969	196,3	16,1	16,4	12,4	10,7	7,6	3,3	0,2	9,1
2003	10 768	189,7	14,8	16,7	12,0	10,8	8,0	2,8	0,3	9,0
2004	11 091	192,7	15,7	18,4	12,6	10,6	7,9	3,1	0,2	9,4
2005*	10 785	186,9	14,8	18,0	12,6	10,2	7,7	3,3	0,2	9,2

1) Vuosina 1969–1985 ikä = suoritusvuosi miinus syntymävuosi, vuodesta 1986 ikä suorituspäivänä.

Åren 1969–1985: ålder=operationsår minus födelseår, från år 1986 ålder på operationsdag.

Years 1969–1985: age= year of operation minus year of birth, from 1986 age on day of operation.

2) Alle 20-vuotiaiden keskeytykset tuhatta 15-19-vuotiasta naista kohden.

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15–19 år.

Number of abortions among under 20-year-olds per thousand women aged 15–19.

*) Ennakkotieto.

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2005*

Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2005*

Table 2. Induced abortions by hospital district and age, 2005*

Sairaanhoitopiiri ¹⁾ Sjukvårdsdistrikt Hospital district	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor i samma åldrar By age group per 1 000 women of the same age							
	15-19 ²⁾	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	15-49
Helsinki ja Uusimaa - Helsingfors och Nyland	17,6	21,0	13,9	11,2	9,0	4,0	0,2	10,5
Helsinki - Helsingfors	15,1	20,2	13,1	10,7	8,3	3,8	0,2	9,5
Uusimaa - Nyland	22,8	21,7	14,6	11,7	10,1	4,3	0,1	11,8
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	15,3	17,5	11,9	9,9	8,3	3,7	0,3	9,3
Satakunta - Satakunta	13,8	18,9	12,9	8,5	6,2	2,9	0,4	8,6
Kanta-Häme - Centrala Tavastland	15,4	16,5	12,0	10,7	6,0	2,7	0,5	8,5
Pirkanmaa - Birkaland	14,1	18,9	10,4	9,6	8,1	3,0	0,2	8,9
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland	14,9	19,0	16,3	13,5	7,7	4,1	0,0	10,1
Kymenlaakso - Kymmenedalen	13,8	24,5	15,6	9,6	7,7	4,2	0,2	9,9
Etelä-Karjala - Södra Karelen	10,5	12,1	12,2	11,0	7,9	1,9	0,2	7,4
Etelä-Savo - Södra Savolax	10,5	18,2	10,8	7,1	6,1	2,3	0,0	7,2
Itä-Savo - Östra Savolax	12,6	16,7	11,3	5,4	5,2	3,2	0,0	7,2
Pohjois-Karjala - Norra Karelen	13,1	13,3	11,2	8,8	6,9	3,2	0,3	7,6
Pohjois-Savo - Norra Savolax	14,8	13,7	15,0	8,2	6,9	2,4	0,3	8,3
Keski-Suomi - Mellersta Finland	11,1	14,8	10,8	9,7	5,6	1,8	0,3	7,6
Etelä-Pohjanmaa - Syd-Österbotten	13,1	11,8	8,5	5,7	5,2	3,1	0,1	6,7
Vaasa - Vasa	12,0	16,2	9,9	11,3	7,6	4,0	0,6	8,7
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	11,2	12,8	11,8	6,4	4,6	2,8	0,4	7,1
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	13,9	14,3	11,0	10,0	5,6	2,3	0,2	8,2
Kainuu - Kajanaland	13,7	16,4	11,2	10,0	5,3	1,4	0,0	7,6
Länsi-Pohja - Västra Österbotten	15,5	25,0	16,2	19,9	12,8	2,7	0,0	12,1
Lappi - Lappland	17,0	21,0	10,0	10,8	9,2	2,7	0,0	9,5
Ahvenanmaa - Åland	17,5	23,9	25,4	6,3	12,1	4,3	0,0	11,7
Yhteensä - Totalt - <i>Total</i>	14,8	18,0	12,6	10,2	7,7	3,3	0,2	9,2

1) **Potilaan asuinkunnan mukaan.** Efter hemkommun. *According to patient's domicile.*

2) **Alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset tuhatta 15–19-vuotiasta naista kohden.**

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15–19 år.

Number of abortions among under 20-year-olds per thousand women aged 15–19.

*) **Ennakkotieto.**

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970–2005*, %

Tabell 3: Indikationer för abort 1970–2005*, %

Table 3: Indications for induced abortion, 1970–2005*, %

Vuosi År Year	Lääke- tieteel- linen Medicinsk Medical	Sosi- aalinen Social	Ettinen Etisk Criminal	Alle 17 v. Under 17 år Age under 17	Täyttänyt 40 v. Över 40 år Age 40 or more	Synnyttänyt 4 lasta Fött 4 barn Given birth to 4 children	Mahdollinen sikiövaurio Möjlig fosterskada Potential foetal defect	Todettu sikiövaurio Konstaterad fosterskada Detected foetal defect	Lapsen- hoitokyvyn rajoittu- neisuus Begränsad förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	Yhteensä Totalt Total	
1970 ⁽¹⁾	44,3	33,0	0,2	3,9	6,1	11,6	0,8	..	0,1	100	14 757
1971 ⁽²⁾	20 622
1972 ⁽²⁾	22 146
1973 ⁽³⁾	9,2	71,5	0,1	4,2	8,5	6,0	0,4	..	0,2	100	23 362
1974 ⁽³⁾	7,7	73,6	0,1	3,3	8,6	6,4	0,3	..	0,1	100	22 846
1975 ⁽³⁾	6,0	74,8	-	5,2	7,8	4,8	1,1	..	0,3	100	21 547
1976 ⁽³⁾	5,4	76,2	-	5,4	7,8	4,1	0,7	..	0,4	100	19 818
1977	5,4	76,4	0,0	6,4	7,1	3,9	0,7	..	0,2	100	17 772
1978	4,3	77,5	0,0	6,9	7,6	3,0	0,6	..	0,2	100	16 928
1979	3,0	78,1	0,0	7,0	8,0	2,6	0,5	..	0,2	100	15 849
1980	3,5	77,6	0,0	7,5	7,6	2,2	1,0	..	0,2	100	15 037
1981	3,4	78,6	0,0	7,0	7,5	2,4	0,9	..	0,2	100	14 120
1982	3,3	79,7	0,1	7,1	6,9	2,0	0,7	..	0,2	100	13 861
1983	3,0	80,7	0,1	6,9	6,7	1,8	0,6	..	0,2	100	13 360
1984	3,1	81,3	0,0	6,1	6,6	2,1	0,7	..	0,1	100	13 645
1985	2,4	82,9	0,1	5,5	6,2	2,1	0,6	..	0,1	100	13 787
1986	1,9	84,1	0,0	4,8	6,1	2,1	0,8	..	0,1	100	13 316
1987	1,7	83,4	-	4,8	7,1	1,8	0,1	..	1,1	100	12 986
1988	1,4	84,5	0,1	4,1	7,2	1,6	1,1	..	0,1	100	12 738
1989	1,1	84,0	0,0	4,0	7,7	1,7	1,4	..	0,1	100	12 646
1990	0,8	83,9	0,0	4,5	7,4	1,8	1,5	..	0,1	100	12 217
1991	0,8	84,3	0,1	4,4	7,3	1,7	1,4	..	0,1	100	11 737
1992	0,8	76,0	0,0	4,3	6,2	1,6	1,7	..	-	100	11 069
1993	0,6	73,7	0,0	4,2	6,0	1,9	1,6	..	0,0	100	10 375
1994	0,5	74,2	0,0	3,8	6,0	2,0	2,2	..	0,0	100	10 012
1995	0,5	77,5	0,0	3,9	5,5	2,0	2,0	0,1	0,0	100	9 872
1996	0,4	80,3	-	3,7	4,8	2,3	2,1	..	0,0	100	10 423
1997	0,3	80,8	0,0	4,6	4,4	2,0	1,9	..	0,0	100	10 250
1998	0,3	85,8	0,0	5,4	4,2	2,2	0,6	1,5	0,0	100	10 751
1999	0,2	85,8	0,1	6,1	4,2	1,7	0,7	1,2	0,0	100	10 837
2000	0,1	84,3	0,1	7,5	3,9	1,8	1,0	1,2	-	100	10 931
2001	0,4	84,7	0,1	7,1	4,2	2,0	0,9	1,2	0,0	101	10 820 ⁽⁴⁾
2002	0,5	86,2	0,1	6,8	3,8	2,1	0,6	1,6	0,0	102	11 158 ⁽⁴⁾
2003	0,5	86,6	0,1	6,7	3,6	2,0	1,1	1,4	0,0	102	10 971 ⁽⁴⁾
2004	0,4	88,4	0,1	5,9	3,4	2,0	0,9	1,3	0,1	102	11 359 ⁽⁴⁾
2005*	0,5	86,9	0,1	6,3	4,0	2,2	0,9	1,7	0,0	103	11 060 ⁽⁴⁾

 1) Nykyisen lain aikana. Under den gällande lagen. *Under the current law.*

 2) Vain kokonaismäärä tilastoitu. Statistik endast över totalt antal. *Statistics on available total number only.*

 3) Perustuu otokseen. Grundar sig på sampel. *Based on a sample.*

 4) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. *More than one indication possible.*

*) Ennakkotieto.

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteiden mukaan 2005*

Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2005*

Table 4: Induced abortions by indication, 2005*

	Peruste - Indikation - Indication									
Siviilisääty, ikä ja synnytysten määrä	Lääketiet.	Sosiaa- linen	Eettinen	Alle 17 v.	Yli 4 - vuo 4 lasta	Mahdollinen	Todettu	Lapsen- hoitokyvyn	Yhteensä 1)	
Civilstånd, ålder och antal	Medicinsk	Social	Etisk	Under	Över 4 - år 4 barn	sikiövaurio	Konstaterad	rajoittu-	Totalt	
förlossningar		Social	Criminal	17 år	Age 4 - 4 children	Möjlig	Konstaterad	neisuus	Total	
Marital status, age and number of deliveries				under 17		fosterskada	fosterskada	Begränsad		
						foetal	foetal	förmåga		
						defect	defect	att sköta		
								barn		
								Limited		
								ability		
Siviilisääty - Civilstånd								to take care		
- Marital status								of children		
Naimisissa - Gift - Married	23	1 675	2	-	185	140	53	102	-	2 180
Naimaton - Ogift - Single	27	6 940	5	675	142	54	36	77	1	7 957
Leski - Änka - Widowed	-	26	-	-	2	4	-	-	-	32
Eronnut - Franskild - Divorced	5	730	4	-	100	41	2	5	-	887
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	2	-	-	1	-	1	-	-	4
Yhteensä - Totalt - Total	55	9 373	11	675	430	239	92	184	1	11 060
Ikä - Ålder - Age ²⁾										
-13	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
14	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50
15	-	-	-	198	-	-	-	-	-	198
16	-	21	1	351	-	-	-	-	-	373
17	-	434	-	71	-	-	-	-	-	505
18	-	582	1	-	-	-	1	3	-	587
19	2	645	-	-	-	-	-	1	-	648
20-24	9	2 882	4	-	-	1	12	21	-	2 929
25-29	16	1 942	3	-	-	35	16	45	1	2 058
30-34	11	1 410	1	-	-	70	25	46	-	1 563
35-39	16	1 194	-	-	-	95	22	43	-	1 370
40-44	1	250	1	-	394	33	16	25	-	720
45-49	-	13	-	-	36	5	-	-	-	54
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä - Totalt - Total	55	9 373	11	675	430	239	92	184	1	11 060
Aiemmat synnytykset - Tidigare förlossningar - Previous deliveries										
0	14	4 980	6	669	47	-	27	84	1	5 828
1	13	1 781	2	6	87	-	42	69	-	2 000
2	14	1 670	2	-	160	-	16	20	-	1 882
3	8	742	1	-	94	7	3	9	-	864
4	4	138	-	-	26	166	2	1	-	337
5	-	51	-	-	12	43	2	1	-	109
6	1	10	-	-	1	16	-	-	-	28
7	1	1	-	-	1	4	-	-	-	7
8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
9-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Yhteensä - Totalt - Total	55	9 373	11	675	430	239	92	184	1	11 060

1) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. More than one indication possible.

2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på operationsdag. Age on the day of operation.

*) Ennakkotieto.

Preliminära uppgifter

Preliminary information.

Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985–2005*

Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985–2005*

Table 5: Induced abortions by gestation length, 1985–2005*

Viikkoja - Veckor - Weeks								
	-7	8	9	10	11	12-	Tuntematon Okänt Unknown	Yhteensä Totalt Total
1985	4 438	3 073	2 637	1 982	943	712	2	13 787
1986	4 542	2 980	2 459	1 783	869	682	1	13 316
1987	4 130	2 951	2 486	1 765	962	679	13	12 986
1988	4 170	2 722	2367	1828	982	667	2	12 738
1989	4 138	2 693	2 448	1 798	858	707	4	12 646
1990	4 074	2 693	2 285	1 680	812	671	2	12 217
1991	4 266	2 565	2 126	1 466	669	645	-	11 737
1992	4 131	2 374	1 987	1 340	628	609	-	11 069
1993	3 996	2 306	1 809	1 158	550	556	-	10 375
1994	4 095	2 140	1 615	1 096	461	605	-	10 012
1995	4 018	2 089	1 661	1 079	436	589	-	9 872
1996	4 199	2 273	1 641	1 102	600	604	4	10 423
1997	4 307	2 253	1 556	1 087	465	581	1	10 250
1998	4 702	2 293	1 596	1 075	459	623	3	10 751
1999	4 770	2 318	1 550	1 098	456	644	1	10 837
2000	4 976	2 233	1 583	1 036	431	672	-	10 931
2001	5 843	1 727	1 213	915	358	683	-	10 739
2002	6 176	1 696	1 096	877	383	741	-	10 969
2003	6 309	1 624	959	783	377	716	-	10 768
2004	6 508	1 712	992	738	407	734	-	11 091
2005*	6 443	1 656	913	680	340	753	-	10 785
%								
1985	32,2	22,3	19,1	14,4	6,8	5,2	0,0	100
1986	34,1	22,4	18,5	13,4	6,5	5,1	0,0	100
1987	31,8	22,7	19,1	13,6	7,4	5,3	0,1	100
1988	32,7	21,4	18,6	14,4	7,7	5,3	0,0	100
1989	32,8	21,3	19,4	14,2	6,8	5,4	0,0	100
1990	33,3	22,0	18,7	13,8	6,6	5,6	0,0	100
1991	36,3	21,9	18,1	12,5	5,7	5,4	0,0	100
1992	37,3	21,4	18,0	12,1	5,7	5,4	0,0	100
1993	38,5	22,2	17,4	11,2	5,3	5,3	-	100
1994	40,9	21,4	16,1	10,9	4,6	5,9	0,0	100
1995	40,7	21,2	16,8	10,9	4,4	6,0	0,0	100
1996	40,3	21,8	15,7	10,6	5,8	5,7	0,0	100
1997	42,0	22,0	15,2	10,6	4,5	5,8	0,0	100
1998	43,8	21,3	14,8	10,0	4,3	5,9	0,0	100
1999	44,0	21,4	14,3	10,1	4,2	5,8	0,0	100
2000	45,5	20,4	14,5	9,5	3,9	6,1	-	100
2001	54,4	16,1	11,3	8,5	3,3	6,4	-	100
2002	56,4	15,5	10,0	8,0	3,5	6,6	-	100
2003	58,6	15,1	8,9	7,3	3,5	6,7	-	100
2004	58,7	15,4	8,9	6,7	3,7	6,5	-	100
2005*	59,7	15,4	8,5	6,3	3,2	7,0	-	100

*) Ennakkotieto.

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987–2005*

Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987–2005*

Table 6: Induced abortions by previous deliveries, 1987–2005*

Aikaisemmat synnytykset								
Tidigare förlossningar								
Previous deliveries								
	0	1	2	3	4	5-	Tuntematon Okänt Unknown	Yhteensä Totalt Total
1987	6 468	2 190	2 649	1 207	321	81	70	12 986
1988	6 544	2165	2552	1105	283	51	38	12 738
1989	6 418	2 194	2 482	1 118	289	75	70	12 646
1990	6 149	2 111	2 481	1 096	287	65	28	12 217
1991	5 698	2 143	2 438	1 055	245	81	77	11 737
1992	5 334	2 133	2 254	991	262	77	18	11 069
1993	4 832	2 031	2 250	904	248	90	20	10 375
1994	4 595	1 957	2 171	945	239	94	11	10 012
1995	4 689	1 908	2 055	900	229	90	1	9 872
1996	4 877	1 986	2 195	998	287	78	2	10 423
1997	4 984	1 833	2 153	953	254	73	-	10 250
1998	5 243	1 991	2 146	1 012	274	85	-	10 751
1999	5 432	1 951	2 133	984	245	92	-	10 837
2000	5 672	1 902	2 064	938	270	85	-	10 931
2001	5 496	1 962	2 011	913	249	107	1	10 739
2002	5 740	1 955	2 024	885	271	94	-	10 969
2003	5 685	1 920	1 924	880	256	103	-	10 768
2004	5 881	2 039	2 010	818	247	96	-	11 091
2005*	5 746	1 976	1 846	837	264	116	-	10 785
%								
1987	49,8	16,9	20,4	9,3	2,5	0,6	0,5	100
1988	51,4	17,0	20,0	8,7	2,2	0,4	0,3	100
1989	50,8	17,3	19,6	8,8	2,3	0,6	0,6	100
1990	50,3	17,3	20,3	9,0	2,3	0,5	0,2	100
1991	48,5	18,3	20,8	9,0	2,1	0,7	0,7	100
1992	48,2	19,3	20,4	9,0	2,4	0,7	0,2	100
1993	46,6	19,6	21,7	8,7	2,4	0,9	0,2	100
1994	45,9	19,5	21,7	9,4	2,4	0,9	0,1	100
1995	47,5	19,3	20,8	9,1	2,3	0,9	0,0	100
1996	46,8	19,1	21,1	9,6	2,8	0,7	0,0	100
1997	48,6	17,9	21,0	9,3	2,5	0,7	-	100
1998	48,8	18,5	20,0	9,4	2,5	0,8	-	100
1999	50,1	18,0	19,7	9,1	2,3	0,8	-	100
2000	51,9	17,4	18,9	8,6	2,5	0,8	-	100
2001	51,2	18,3	18,7	8,5	2,3	1,0	0,0	100
2002	52,3	17,8	18,5	8,1	2,5	0,9	-	100
2003	52,8	17,8	17,9	8,2	2,4	1,0	-	100
2004	53,0	18,4	18,1	7,4	2,2	0,9	-	100
2005*	53,3	18,3	17,1	7,8	2,4	1,1	-	100

*) Ennakkotieto.

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987–2005*

Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987–2005*

Table 7: Induced abortions by previous abortions, 1987–2005*

Aikaisemmat keskeytykset							Tuntematon Okänt Unknown	Yhteensä Totalt Total
Tidigare aborter								
Previous abortions								
0	1	2	3	4	5-			
1987	9 454	2 529	537	144	33	13	277	12 986
1988	9 320	2 485	550	114	32	9	228	12 738
1989	9 152	2 526	547	124	28	20	249	12 646
1990	8 904	2 487	573	120	32	19	82	12 217
1991	8 332	2 474	596	167	36	18	114	11 737
1992	7 701	2 455	620	147	45	23	78	11 069
1993	7 186	2 299	591	148	41	17	93	10 375
1994	6 930	2 132	602	141	44	29	134	10 012
1995	6 911	2 155	578	154	47	24	3	9 872
1996	7 247	2 274	663	174	35	28	2	10 423
1997	7 172	2 185	626	182	44	27	14	10 250
1998	7 580	2 262	642	182	58	27	-	10 751
1999	7 776	2 184	624	171	52	29	1	10 837
2000	7 769	2 257	649	172	55	29	-	10 931
2001	7 597	2 249	621	189	48	33	2	10 739
2002	7 701	2 275	686	218	49	38	2	10 969
2003	7 357	2 385	699	198	84	45	-	10 768
2004	7 566	2 396	787	230	66	45	1	11 091
2005*	7 344	2 328	752	232	70	59	-	10 785
%								
1987	72,8	19,5	4,1	1,1	0,3	0,1	2,1	100
1988	73,2	19,5	4,3	0,9	0,3	0,1	1,8	100
1989	72,4	20,0	4,3	1,0	0,2	0,2	2,0	100
1990	72,9	20,4	4,7	1,0	0,3	0,2	0,7	100
1991	71,0	21,1	5,1	1,4	0,3	0,2	1,0	100
1992	69,6	22,2	5,6	1,3	0,4	0,2	0,7	100
1993	69,3	22,2	5,7	1,4	0,4	0,2	0,9	100
1994	69,2	21,3	6,0	1,4	0,4	0,3	1,3	100
1995	70,0	21,8	5,9	1,6	0,5	0,2	0,0	100
1996	69,5	21,8	6,4	1,7	0,3	0,3	0,0	100
1997	70,0	21,3	6,1	1,8	0,4	0,3	0,1	100
1998	70,5	21,0	6,0	1,7	0,5	0,3	-	100
1999	71,8	20,2	5,8	1,6	0,5	0,3	0,0	100
2000	71,1	20,6	5,9	1,6	0,5	0,3	-	100
2001	70,7	20,9	5,8	1,8	0,4	0,2	0,0	100
2002	70,2	20,7	6,3	2,0	0,4	0,2	0,0	100
2003	68,3	22,1	6,5	1,8	0,8	0,4	-	100
2004	68,2	21,6	7,1	2,1	0,6	0,3	0,0	100
2005*	68,1	21,6	7,0	2,2	0,6	0,5	-	100

*) Ennakkotieto.

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy ennen keskeytystä 1980, 1985, 1989–2005*, %

Tabell 8: Preventivmedel använda av abortpatienter före abort 1980, 1985, 1989–2005*, %

Table 8: Contraceptives used by abortion patients before abortion, 1980, 1985, 1989–2005*, %

	E-tabletti¹⁾	Kohdunsisäinen hormoniehkäisin	Kierukka	Kondomi	Sterilointi	Muu	Ei mitään	Tuntematon	Jälkiehkäisy²⁾	Yhteensä³⁾
	<i>P-piller Pill</i>	<i>Hormonspiral Hormone releasing IUD</i>	<i>Spiral IUD</i>	<i>Kondom Condom</i>	<i>Sterilisering Sterilisation</i>	<i>Annat Other</i>	<i>Ingenting Nothing</i>	<i>Okänt Unknown</i>	<i>Akut p-piller Post-coital oral contraceptive</i>	<i>Totalt Total</i>
1980	4,6	..	10,9	41,8	..	5,0	32,3	5,4	..	100,0
1985	5,9	..	8,0	41,6	..	6,1	33,5	4,9	..	100,0
1989	7,9	..	5,1	46,0	..	4,0	35,8	4,1	..	102,9
1990	7,7	..	5,2	45,7	..	3,9	35,6	4,5	..	102,6
1991	8,3	..	5,2	44,1	..	3,9	36,7	4,7	..	102,9
1992	8,1	..	4,6	46,9	0,5	3,3	34,5	4,6	..	102,5
1993	7,8	..	4,8	47,3	0,7	2,8	34,0	5,5	..	100,0
1994	7,1	..	3,8	47,1	0,5	2,7	35,9	5,7	..	102,8
1995	7,8	..	3,5	47,7	0,5	3,2	34,4	6,0	..	103,1
1996	7,4	..	3,1	49,1	0,4	2,9	33,6	5,9	..	100,0
1997	7,8	..	2,4	49,9	0,5	3,1	32,8	6,2	..	100,0
1998	7,2	0,2	1,9	50,0	0,6	2,2	35,1	5,0	1,0	103,2
1999	7,9	0,1	1,7	50,5	0,6	1,9	35,1	4,6	1,3	103,7
2000	8,5	0,2	1,5	49,7	0,4	1,9	35,5	4,7	0,9	103,3
2001	8,6	0,1	1,4	49,9	0,4	1,7	35,7	3,5	1,2	102,5
2002	9,1	0,2	1,3	49,7	0,4	1,8	35,7	4,8	1,5	104,5
2003	9,8	0,3	1,0	47,8	0,2	2,4	35,5	5,9	2,3	105,2
2004	9,8	0,2	1,0	46,7	0,3	3,4	36,4	4,4	2,1	104,3
2005*	9,3	0,3	0,9	46,6	0,4	3,6	36,9	4,5	2,7	105,2

1) **Vuodesta 1998 E-tabletti tai kapseli.** Från år 1998 p-piller eller kapsel. *From 1998 the pill or capsule.*

2) **Ei muuta mainittu.** Inga andra nämnts. *No mention of other contraceptive.*

3) **Useampi menetelmä mahdollinen.** Flera än en metod möjliga. *More than one method possible.*

*) **Ennakkotieto.**

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 9. Raskaudenkeskeytyspotilaille suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen 1983–2005*, %

Tabell 9. Planerad preventivmetod för abortpatienter efter abort 1983–2005*, %

Table 9. Planned contraceptive method for abortion patients after abortion, 1983–2005*, %

	E-tabletti¹⁾	Kohdunsisäinen hormoniehkäisin	Kierukka	Kondomi	Sterilointi	Muu	Ei mitään	Tuntematon	Yhteensä
	<i>P-piller Pill</i>	<i>Hormonspiral Hormone releasing IUD</i>	<i>Spiral IUD</i>	<i>Kondom Condom</i>	<i>Sterilisering Sterilisation</i>	<i>Annat Other</i>	<i>Ingenting Nothing</i>	<i>Okänt Unknown</i>	<i>Totalt Total</i>
1983	33,1	0,0	47,6	2,4	0,0	6,3	1,3	9,4	100,0
1984	29,2	0,0	48,2	2,0	0,0	9,6	1,3	9,7	100,0
1985	26,5	0,0	48,0	2,2	0,0	12,0	1,1	10,2	100,0
1986	51,1	0,0	23,6	2,7	0,0	11,9	1,2	9,5	100,0
1987	53,0	0,0	22,9	3,0	0,0	12,4	1,2	9,2	100,0
1988	56,1	0,0	21,9	3,0	0,0	11,0	1,3	8,0	100,0
1989	57,7	0,0	19,5	3,2	0,0	11,2	1,3	8,3	100,0
1990	57,5	0,0	20,3	3,2	0,0	10,6	1,6	8,0	100,0
1991	54,8	0,0	22,5	2,6	0,1	10,5	1,4	9,3	100,0
1992	54,9	0,0	24,4	2,6	6,9	2,7	0,9	8,4	100,0
1993	57,0	0,0	22,7	3,0	8,0	1,3	1,1	7,9	100,0
1994	57,4	0,0	21,9	2,7	8,1	1,1	1,4	8,5	100,0
1995	56,6	0,0	21,9	3,1	8,1	0,8	1,4	8,5	100,0
1996	53,7	0,0	22,8	3,5	8,9	0,5	1,2	9,4	100,0
1997	57,6	0,0	21,7	3,2	7,9	0,8	1,2	8,4	100,0
1998	59,6	5,6	15,6	4,3	8,3	0,8	1,3	6,5	100,0
1999	60,4	7,0	15,1	3,8	7,2	1,0	1,1	6,4	100,0
2000	63,3	7,2	13,7	3,5	6,2	0,8	1,4	6,4	100,0
2001	61,7	8,1	14,2	3,6	6,0	0,7	1,3	5,9	100,0
2002	61,6	9,1	12,8	3,6	5,7	1,0	1,4	6,8	100,0
2003	57,6	9,6	11,8	3,3	4,3	7,0	1,7	7,2	100,0
2004	53,6	10,1	11,5	3,7	3,8	11,8	1,2	7,0	100,0
2005*	53,8	11,5	10,9	3,1	3,5	11,5	1,3	7,0	100,0

1) **Vuodesta 1998 E-tabletti tai kapseli.** Från år 1998 p-piller eller kapsel. *From 1998 the pill or capsule.*

*) **Ennakkotieto.**

Preliminära uppgifter.

Preliminary information.

Taulukko 10: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 2000–2005*

Tabell 10: Abortmetoder 2000–2005*

Table 10: Methods for induced abortion, 2000–2005*

Prostaglandiini- ja Mifegyne-keskeytysten lukumäärä päivitetään toukokuussa 2006

Antalet prostaglandin och Mifegyne aborter uppdateras i maj 2006

The number of abortions performed by using prostaglandin or Mifegyne is updated in May 2006

	Laajennus, Laajennus, imukaavinta		tyhjennys, tyhjennys, imukaavinta		Varhaisu-	Abortiivaine	Prostaglandiini tai muu lääke Mifegyne		Keisarileikkaus	Muu	Tuntematon	Yhteensä
	Dilatation, vakuu- aspiration	Dilatation, exeres, vakuu- aspiration	Tidig aspiration	Abort- medel			Prostaglandin eller annat läkemedel	Mifegyne	Kejsarsnitt	Annan	Okänd	Totalt
	<i>Dilation, suction curette</i>	<i>Dilation, evacuation, suction curette</i>	<i>Early suction</i>	<i>Abortion- inducing drug</i>			<i>Prostaglandin or other drug</i>	<i>Mifegyne</i>	<i>Caesarean section</i>	<i>Other</i>	<i>Unknown</i>	<i>Total</i>
Yhteensä - Totalt - Total												
2000	9 227	338	191	481	.	.	3		10	-		10 931
2001	7 203	230	159	518	.	.	5		28	-		10 739
2002	6 011	138	142	603	.	.	3		8	-		10 969
2003	5 006	112	104	658	.	.	2		5	-		10 768
2004	4 560	120	82	682	.	.	2		9	1		11 091
2005*	3 710	95	94	704	.	.	-		9	-		10 785
%												
2000	84,4	3,1	1,7	4,4	.	.	0,0		0,1	-		100
2001	67,1	2,1	1,5	4,8	.	.	0,0		0,3	-		100
2002	54,8	1,3	1,3	5,5	.	.	0,0		0,1	-		100
2003	46,5	1,0	1,0	6,1	.	.	0,0		0,0	-		100
2004	41,1	1,1	0,7	6,1	.	.	0,0		0,1	-		100
2005*	34,4	0,9	0,9	6,5	.	.	0,0		0,1	-		100
Ennen 13. viikkoa / Före vecka 13 / Before 13th week												
2000	9 138	284	191	14	.	.	-		4	-		10 259
2001	7 119	195	159	22	.	.	-		8	-		10 056
2002	5 950	109	142	15	.	.	-		3	-		10 228
2003	4 962	87	104	17	.	.	-		2	-		10 052
2004	4 522	95	82	17	.	.	1		4	1		10 357
2005*	3 664	82	94	16	.	.	-		4	-		10 032
%												
2000	89,1	2,8	1,9	0,1	.	.	-		0,0	-		100
2001	70,8	1,9	1,6	0,2	.	.	-		0,1	-		100
2002	58,2	1,1	1,4	0,1	.	.	-		0,0	-		100
2003	49,4	0,9	1,0	0,2	.	.	-		0,0	-		100
2004	43,7	0,9	0,8	0,2	.	.	0,0		0,0	0,0		100
2005*	36,5	0,8	0,9	0,2	.	.	-		0,0	-		100
13. viikolla tai sen jälkeen /vecka 13 eller därefter / 13th week of thereafter												
2000	89	54	-	467	.	.	3		6	-		672
2001	84	35	-	496	.	.	5		20	-		683
2002	61	29	-	588	.	.	3		5	-		741
2003	44	25	-	641	.	.	2		3	-		716
2004	38	25	-	665	.	.	1		5	-		.
2005*	46	13	-	688	.	.	-		5	-		753
%												
2000	13,2	8,0	-	69,5	.	.	0,4		0,9	-		100
2001	12,3	5,1	-	72,6	.	.	0,7		2,9	-		100
2002	8,2	3,9	-	79,4	.	.	0,4		0,7	0,0		100
2003	6,1	3,5	-	89,5	.	.	0,3		0,4	-		100
2004	5,2	3,4	-	90,6	.	.	0,1		0,7	-		100
2005*	6,1	1,7	-	91,4	.	.	0,1		0,7	-		100

*Ennakkotieto.

*Preliminära uppgifter.

*Preliminary information.